

IMPLANTE SOLO CON PROGESTINA



¿Cómo uso el implante?

- El implante es colocado por un proveedor debajo de la piel de la parte superior del brazo por un período de hasta 3 años.
- El implante puede extraerse en cualquier momento que usted desee, o cuando sea el momento de ser retirado o reemplazado.
- Usted tendrá que regresar a la clínica para que el proveedor retire o reemplace el implante.

Momento de poner el implante

- Si el implante se coloca dentro de los primeros 5 días de su sangrado menstrual, no es necesario usar ningún otro método de respaldo.
- Si el implante se coloca después de los primeros 5 días de su sangrado menstrual, use otro método de respaldo durante 7 días.
- Haga una cita para que le retiren o reemplacen el implante antes de que esté vencido.

¿Qué pasa si no me cambio el implante a tiempo?

Las probabilidades de quedar embarazada aumentan si el implante está vencido.

Si el implante está vencido:

- Haga una cita con la clínica cuanto antes.
- Use otro método de respaldo si tiene relaciones sexuales sin protección.

Beneficios y efectos secundarios comunes

La mayoría de las personas no sufren efectos secundarios, mientras que otras sí. Los siguientes no son todos los posibles efectos secundarios.

- Sangrado más ligero o irregular
- Sensibilidad en los senos
- Cambios de estado de ánimo
- Disminución del deseo sexual

Señales de alerta: ACHES (acrónimo de los efectos secundarios de métodos anticonceptivos)

Si presenta alguno de estos síntomas, llame a su clínica cuanto antes.



Dolor abdominal



Dolor de pecho



Dolor de cabeza-intenso



Problemas oculares



Hinchazón en las piernas

IMPLANTE SOLO CON PROGESTINA

previenen el embarazo al:



Impedir que el óvulo sea liberado



Cambiar el revestimiento uterino



Espesar el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides.



El implante está compuesto por una hormona similar a la producida por su cuerpo.



Las probabilidades de quedar embarazada son menores cuando se usa el implante. Cada año, 1 de cada 100 personas que lo usan de manera regular quedan embarazadas.



Cuando se extrae el implante, las probabilidades de quedar embarazada son las mismas que como eran antes de usar el implante.



Algunos medicamentos pueden reducir la efectividad de su anticonceptivo. Consulte con su proveedor sobre los medicamentos que está tomando.



El implante no protege contra las Infecciones de transmisión sexual (STIs, por sus siglas en inglés) ni el VIH. Siempre use un condón para protegerse.

REGRESE A LA CLÍNICA:

- Para chequeos anuales
- Si desea cambiarse a otro método
- Si tiene problemas con los efectos secundarios

NOTAS: