


COVID-19 y embarazo en Tennessee



Entre todos los bebés nacidos de residentes de Tennessee del 1 de marzo de 2020 al 31 de julio de 2022, **15 489 (8 %)** tuvieron COVID-19 materna confirmada por PCR durante el embarazo



Las internaciones en la UCI en el momento del parto fueron **4 veces** más altas entre las mujeres con COVID-19 durante el embarazo que entre aquellas que no la tuvieron (**0,4 % frente al 0,1 %**).



Se **confirmaron 15 muertes maternas** debido a la COVID-19 en embarazos al 31 de julio de 2022



Entre las muertes maternas confirmadas, ninguna tenía documentación de vacunación actualizada contra la de COVID-19

Los CDC recomiendan la vacunación contra la COVID-19 para todas las personas a partir de los 6 meses de edad, incluidas aquellas mujeres que estén embarazadas, amamantando, tratando de quedar embarazadas actualmente o que podrían quedar embarazadas en el futuro



La vacuna contra la COVID-19 es segura y eficaz en el embarazo



La vacuna contra la COVID-19 **NO** se asocia con una disminución de la fertilidad



La vacuna contra la COVID-19 **NO** se asocia con índices más altos de abortos espontáneos



La vacuna contra la COVID-19 **NO** puede causarle COVID-19 ni alterar su ADN