

# Desigualdad racial en muertes relacionadas con el embarazo



De 2017 a 2019, 66 mujeres de raza negra en Tennessee murieron durante el embarazo o durante el año de embarazo

1 de 2

de estas muertes fueron determinadas como muertes relacionadas con el embarazo por un comité de revisión de mortalidad materna

55%

de estas muertes relacionadas con el embarazo ocurrieron una semana o más después del parto

Las mujeres de raza negra en Tennessee

4x

tienen 4 veces más probabilidades de morir a causa de complicaciones del embarazo que las mujeres de raza blanca

Principales causas de muertes relacionadas con el embarazo entre las mujeres de raza negra:

1. Preeclampsia y eclampsia
2. Afecciones cardiovasculares\*
3. Embolia y homicidio

91%

de las muertes relacionadas con el embarazo de las mujeres de raza negra se determinaron que eran prevenibles

## Señales de alerta materna

- Dificultad para respirar
- Dolor de cabeza que no se alivia
- Ideas de dañarse a sí misma o a su bebé
- Hemorragia vaginal o pérdida de líquido por la vagina después del embarazo
- Dolor intenso
- Cansancio extremo
- Hinchazón excesiva en las manos o la cara
- Cambios en la visión
- Dolor de pecho o acelerado ritmo cardiaco
- Mareos o desmayos
- Náuseas severas o vómitos
- Fiebre

**Usted sabe si algo anda mal, preste atención y actúe**  
**¡Consulte con su médico si presenta alguna de estas señales de alerta!**

\*incluye afecciones cardiovasculares y coronarias y cardiomiopatía



Departamento de Salud de Tennessee, Autorización No. 355582. Este documento se promulgó a un costo de \$0.10 por copia, 6,000 copias. Agosto de 2020

Esta publicación cuenta con la subvención número 6 NU58DP006681-02-03 financiada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representa las opiniones oficiales de los CDC o del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

