

Desigualdad racial en muertes relacionadas con el embarazo



De 2017 a 2019, 66 mujeres de raza negra en Tennessee murieron durante el embarazo o durante el año de embarazo

1 de 2

de estas muertes fueron determinadas como muertes relacionadas con el embarazo por un comité de revisión de mortalidad materna

55%

de estas muertes relacionadas con el embarazo ocurrieron una semana o más después del parto

Las mujeres de raza negra en Tennessee

4x

tienen 4 veces más probabilidades de morir a causa de complicaciones del embarazo que las mujeres de raza blanca

Principales causas de muertes relacionadas con el embarazo entre las mujeres de raza negra:

1. Preeclampsia y eclampsia
2. Afecciones cardiovasculares*
3. Embolia y homicidio

91%

de las muertes relacionadas con el embarazo de las mujeres de raza negra se determinaron que eran prevenibles

Oportunidades de prevención



Clínicas y sistemas hospitalarios

- Establecer centros de transferencia primaria y secundaria basado en el nivel de cuidado para pacientes de alto riesgo.
- Implementar patrones de tratamiento nacionales para afecciones cardiovasculares en el embarazo y posparto.
- Implementar capacitación en diversidad para prevenir el racismo y los prejuicios.
- Implementar protocolos estandarizados para seguimiento e ingreso en el período de posparto.



Proveedores de atención médica

- Asegurarse de que las pacientes de alto riesgo son atendidas por un equipo multidisciplinario que incluya un coordinador de caso, orientador médico, obstetra, y especialista en medicina materno fetal para garantizar un adecuado seguimiento de la paciente y la comunicación entre los centros, los médicos y las pacientes durante y después del embarazo.
- Educar a las pacientes acerca de las cardiopatías durante el embarazo y los indicios de exacerbación de la hipertensión en el embarazo.

*incluye afecciones cardiovasculares y coronarias y cardiomiopatía



Departamento de Salud de Tennessee, Autorización No. 355582. Este documento se promulgó a un costo de \$0.10 por copia, 6,000 copias. Agosto de 2020

Esta publicación cuenta con la subvención número 6 NU58DP006681-02-03 financiada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representa las opiniones oficiales de los CDC o del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

